


Canale Rogio 15 – Fossa Nera

Data: Lug 2012  
Rilievi fotografici

Lungh. tratto: 480 mt



Carta di funzionalità e punteggio dell'IFF



**Subindice Morfologia: Pessima (12)**

Tratto canalizzato non arginato, con variazione idrica pari al solo battente idraulico e conseguente assenza di efficienza di esondazione durante le piene ordinarie; il fondo dell'alveo, limoso, presenta una minor copertura ad idrofite con conseguente scarsa capacità di ritenzione del sistema. Elevata evidente erosione con presenza di rive nude.

<b>IDONEITA' ITTICA:</b>					<b>PF = 10</b>	
<b>Buona</b>						
ZR	AF	OM	PC	SB	D	
3	3	2	2	0	0	

**Subindice vegetazione**

<b>Dx</b>	<b>Primaria 7 - V</b>	<b>Sx</b>	<b>Primaria 7 - V</b>
Entrambe le sponde presentano vegetazione erbacea continua e consolidata; il pioppeto giovane presente in destra idraulica rappresenta territorio circostante.			

Tra le piante acquatiche, presenti solo a tratti: *Nuphar luteum*, *Potamogeton pectinatus*, *Myriophyllum sp.* e *Ceratophyllum sp.* *Lemna sp.* e *Tipha latifolia*.

Evidente anossia sulle rive.


Canale Rogio 16 – Valle ponticello

Data: Lug 2012  
Rilievi fotografici

Lungh. tratto: 290 mt



Carta di funzionalità e punteggi dell'IFF



**Subindice Morfologia: Pessima (12)**

Tratto canalizzato, arginato su entrambe le sponde, con variazione idrica del solo battente idraulico e conseguente assenza di efficienza di esondazione durante le piene ordinarie; Fondo limoso rivestito da idrofite rade.

<b>IDONEITA' ITTICA:</b>					<b>PF = 10</b>
Buono					
ZR	AF	OM	PC	SB	D
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Subindice vegetazione**

<b>Dx</b>	<b>Secondaria 30 – III</b>	<b>Sx</b>	<b>Secondaria 7 – V</b>
Boschetto ripario con salici e pioppo di ampiezza superiore ai 10 m con discontinuità inferiore al 25%. Presenza di ailanto		Il boschetto si trova esternamente all'argine; la sponda è costituita da vegetazione erbacea non igrofila continua e consolidata.	

Copertura di specie tolleranti inferiore al 35% dell'area totale: presenza di *Lemna sp.* e *Myriophyllum sp*

Rogio 17 – Baracca di Nanni

Data: Lug 2012  
Rilievi fotografici

Lungh. tratto: 1250 m



**Subindice Morfologia: Pessima (12)**  
Come la scheda precedente

<b>IDONEITA' ITTICA:</b>					<b>PF = 7</b>
<b>Poco Sufficiente</b>					
ZR	AF	OM	PC	SB	D
2	2	1	2	0	0

**Subindice vegetazione**

<b>Dx</b>	<b>Secondaria 7 - V</b>	<b>Sx</b>	<b>Secondaria 7 - V</b>
-----------	-----------------------------	-----------	-----------------------------

Vegetazione erbacea rigogliosa su entrambe le sponde; in sponda destra, presenza sporadica di nuclei di Phragmythes oltre a cespugli di ailanto.

